
KIILTO KLORIITTI FORTE

Дезинфицирующее средство





Средство для дезинфекции поверхностей, скорлупы яиц, овощей, фруктов, зелени.

Объекты/области применения	Используется для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов ухода за больными, медицинских изделий, средств личной гигиены, игрушек, белья (ручным и механизированным способом – в стиральных машинах), посуды (столовой, лабораторной, аптечной), санитарно-технического оборудования, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, уборочного инвентаря, мусороуборочного оборудования при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральных уборок в медицинских организациях, клинических, микробиологических и других лабораториях; на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные и др.), организациях общественного питания, учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов в помещениях классов C и D.
Характеристики продукта	Средство обладает бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным действием, отбеливающими свойствами. Многофункциональное средство для дезинфекции и очистки поверхностей, отходов, посуды и белья; для обработки поверхности пищевых яиц с целью снижения обсемененности скорлупы на предприятиях пищевой промышленности (в т.ч. кондитерской).
Инструкции по использованию и дозировке	Растворы средства используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания. • В медицинских организациях используются концентрации 0,05-5% (по АХ) с экспозицией 15-120 мин. • Дезинфекция поверхности скорлупы яиц осуществляется 0,1% раствором по препарату с экспозицией 2 мин. • Для санитарной обработки поверхностей производственных, бытовых помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары используют 0,3-5% раствор по препарату сэкспозицией 15-60 мин. • Дезинфекция поверхностей, контаминированных вирусом АЧС, производится 3% раствором попрепарату с экспозицией 30 мин. • Для дезинфекции овощей, фруктов, зелени используется 0,5% раствор средства с экспозицией 15 мин. Температура раствора - 20±2°C. Метод обработки - погружение. Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в инструкции по применению средства.
Внимание	Необходимо тщательно изучить предупреждающие знаки на упаковке.Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные /поверхностные или подземные воды и в канализацию.

ООО “КиилтоКлин” | 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14А, БЦ «Ренессанс Премиум»
8 (800) 333-30-33 (звонки по России), +7 (812) 425-33-04 | info.ru@kiilto.com | www.kiilto.ru

Состав

Активное вещество		Воздействие
Вода		
Гипохлоридный раствор натрия (количество активного хлора)	10 - 12 %	Образует хлорную кислоту, уничтожающую микроорганизмы
Гидроксид натрия	< 5 %	Стабилизирует активное вещество

pH продукта

10.5 щелочной

Внешний вид и запах

Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым запахом хлора

Страна производства

РОССИЯ

Размер упаковки / код продукта

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
3 x 5 л	205157	4607070471165	канистра

Дополнительная информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.