ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ITALMAS PROFESSIONAL CLEANING

Россия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
pk-izhsintez.ru

«DESOLUT SDIC»

средство моющее с дезинфицирующим эффектом

ТУ 2381-006-74048040-08

Назначение:
Хлорные таблетки белого цвета массой 3,40 гр. ± 0,3 гр.
Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных инфекций, споры бацилл), вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5NI, А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов.
Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т. ч. одноразовой и лабораторной), предметов для мытья посуды, игрушек, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из резиновых и полимерных материалов, уборочного инвентаря и материала при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции.

Область применения:
Применяется на предприятиях различного профиля, в том числе на предприятиях молочной, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей промышленности, предприятиях по производству алкогольных, безалкогольных напитков, минеральных вод, предприятиях общественного питания и торговли, культурно-оздоровительных и спортивных комплексах, в детских и образовательных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бани, прачечные, парикмахерские, промышленные рынки, общественные туалеты и др.), на учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, а также населением в быту.

Способ применения:
Режимы дезинфекции при бактериальной (кроме туберкулеза) инфекции 0,015-0,03% (150-300 ppm) раствор по АХ (1-2 таб. на 10 л воды) на некритические объекты и 0,1-0,2% (1000-2000 ppm) раствор по АХ (7-14 таб. на 10 л воды) на критические объекты;
при туберкулезе 0,2-0,3% (2000-3000 ppm) раствор по АХ (14-20 таб. на 10 л воды);
при вирусных инфекциях 0,06-0,1% (600-1000 ppm) раствор по АХ (4-7 таб. на 10 л воды);
при кандидозах и дерматофитиях 0,1-0,2% (1000-2000 ppm) раствор по АХ (7-14 таб. на 10 л воды).

Состав:
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХИЦК) в количестве 84%, содержание активного хлора в таблетках 45,5 %.
pH: 6-9

Условия хранения:
Средство хранить в хорошо вентилируемых сухих помещениях, защищенных от влаги и солнечных лучей в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от -30 °С до +30 °С отдельно от лекарственных препаратов.

Меры предосторожности:
Опасно! Использовать строго по назначению. Не глотать, не вдыхать. Во время работы использовать перчатки и защитные очки. Хранить в недоступном для детей месте.
В случае попадания в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

Срок годности: таблетки в закрытой банке – 5 лет, рабочий раствор – 7 суток.

Упаковка: 1 кг